

■ Les vaccins sont-ils sûrs ?

Oui, les vaccins présentent les garanties les plus élevées de la médecine moderne. Les vaccins font l'objet d'une surveillance constante. S'il n'existait pas de vaccins, le nombre d'enfants malades et le nombre des complications graves des maladies seraient beaucoup plus importants. Les vraies contre-indications aux vaccins sont rares. Parlez-en à votre médecin.

■ Que faire si un vaccin n'a pas été donné ?

Pour être efficaces, toutes les doses de vaccins doivent être données en respectant le calendrier recommandé. Si vous avez oublié un rendez-vous, si votre enfant a été malade, adressez-vous à votre médecin. Il remettra à jour les vaccinations de votre enfant, sans tout recommencer depuis le début.

■ Quand mon enfant devra-t-il recevoir ses prochains vaccins ?

Une fois la vaccination du nourrisson complétée, les rappels se font à l'âge de 5-6 ans, puis à 11-12 ans et à 15-16 ans.


■ Pour en savoir plus, consultez le site [www.sante.cfwb.be](http://www.sante.cfwb.be), rubrique vaccination.



Editeur responsable : Dr. Demoulin  
Boulevard Léopold II, 44 - 1080 Bruxelles.


D/2006/10.134/1

# CALENDRIER DE VACCINATION 2006



# Quels vaccins pour protéger votre bébé ?

Edition juin 2006



# En bref

- La vaccination protège utilement contre plusieurs maladies infectieuses dangereuses. Dès l'âge de 2 mois, on recommande de vacciner tous les nourrissons contre 11 maladies.
- Pour être efficace, la vaccination doit être bien faite : toutes les doses doivent être données, en respectant au mieux le calendrier recommandé.
- Le médecin de la consultation des nourrissons de l'ONE et des milieux d'accueil (crèches,...), le pédiatre ou le médecin de famille peuvent vacciner votre bébé.
- Chaque enfant, chaque adulte, doit posséder sa carte de vaccination. C'est le seul moyen de connaître les vaccins reçus tout au long de la vie.

# Que faire ?

- La vaccination du nourrisson commence à l'âge de 2 mois et devrait être terminée vers l'âge de 15 mois.
- La vaccination commence avec un vaccin combiné, appelé hexavalent parce qu'il protège votre bébé contre 6 maladies à la fois : la poliomyélite, la diphtérie, le tétanos, la coqueluche, les infections invasives à *Haemophilus influenzae* de type b et l'hépatite B. Cette vaccination se fait en 4 doses. Les 3 premières sont données à 2, 3 et 4 mois; la dernière à 14-15 mois.
- La vaccination contre le pneumocoque est actuellement recommandée aux mêmes âges que le vaccin hexavalent. Celui-ci s'administre séparément. En 2006, le vaccin ne peut être obtenu gratuitement : vous êtes invité à l'acheter en pharmacie. Renseignez-vous auprès de votre mutuelle car certaines remboursent une partie de ce vaccin très onéreux.
- A 12-13 mois, le médecin administre 2 vaccins à votre enfant : celui contre la rougeole, la rubéole et les oreillons (vaccin RRO) et celui contre le méningocoque C.
- A 18 mois, vous devez remettre à la commune le certificat de vaccination contre la poliomyélite.
- Faites noter les vaccins donnés sur la carte de vaccination et dans le carnet de l'enfant. Conservez précieusement ces 2 documents.
- Les vaccins recommandés sont gratuits (excepté le pneumocoque) quand votre médecin commande les doses à la Communauté française, à l'aide des vignettes autocollantes. Celles-ci sont insérées au centre du carnet de l'enfant que vous avez reçu à la naissance de bébé. Sinon, la consultation de nourrissons de l'ONE proche de votre domicile peut vous aider à obtenir un carnet de l'enfant.

# Pour en savoir plus

## ■ Pourquoi se faire vacciner ?

Pour se protéger soi-même contre des maladies dangereuses et pour éviter de transmettre la maladie à d'autres, trop jeunes, trop âgés ou trop malades pour supporter une infection ou pour recevoir un vaccin. Quand plus de 95% des enfants seront vaccinés, plusieurs maladies disparaîtront de nos pays comme c'est déjà le cas pour la poliomyélite.

## ■ Pourquoi votre enfant doit-il être vacciné s'il fréquente un milieu d'accueil ?

Les risques infectieux augmentent dès que les enfants vivent en groupe (crèches, gardiennes...). C'est la raison pour laquelle on vous demande de faire vacciner votre enfant suivant le calendrier recommandé.

## ■ Comment mon enfant va-t-il se sentir après la vaccination ?

Tous les enfants réagissent différemment. La grande majorité d'entre eux n'auront pas de réactions indésirables. Parfois, des réactions peuvent survenir dans les heures ou les jours qui suivent; elles sont le plus souvent sans gravité : fièvre, rougeur et douleur à l'endroit de l'injection. Demandez conseil au médecin pour savoir comment les traiter.

